

proviennent des plaines moins élevées du Mozambique, du Transvaal et du pays des Zoulous. Cependant l'acclimatement de ces variétés en Europe ne semble pas présenter de difficultés, puisque des espèces essentiellement montagnardes, comme l'*Equus zebra*, y vivent parfaitement. D'ailleurs, la douceur et la docilité de toutes les variétés du Zèbre de Burchell est un fait bien établi : cette espèce est facile à dresser et l'on peut l'atteler à des voitures légères. On ne saurait donc trop engager les naturalistes voyageurs et les marchands naturalistes à se procurer des jeunes de ces variétés qui, transportés vivants en Europe, feraient l'ornement de nos jardins zoologiques.

M. CH. BRONGNIART met sous les yeux de l'assemblée des bœaux renfermant des Guêpes et des Cétoines à l'état de larves, de nymphes et d'Insectes adultes. Ces spécimens ont été préparés par M. Henri Rouyer, boursier du Muséum, qui a pu conserver la blancheur des larves et des nymphes, grâce à un liquide dont il fera connaître la formule ultérieurement.

ANTHICIDES (COL. HÉTÉROMÈRES) AFRICAINS NOUVEAUX
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. M. PIC.

Xylophilus Maindroni n. sp. ♀ ♂.

Large, peu brillant, d'un testacé roussâtre à pubescence fine avec les élytres ornés d'une fascie médiane peu distincte. Tête courte et large, un peu arquée en arrière, à ponctuation assez forte et écartée; yeux gros, noirs, éloignés l'un de l'autre et touchant presque le bord postérieur de la tête. Antennes testacées, pas très longues, épaissies à l'extrémité, insérées en avant des yeux; troisième article plus mince que le deuxième et à peine plus long; moins long que le quatrième, surtout ♂. Prothorax tout à fait transversal, anguleux en avant, avec une large dépression transversale devant la base, pas très marquée; ponctuation assez forte et peu écartée. Écusson allongé, triangulaire. Élytres larges, subparallèles et un peu moins larges ♂, légèrement arqués sur les côtés ♀, avec les épaules droites mais arrondies; l'extrémité arrondie, la ponctuation forte et peu écartée; une facie médiane brune à contours peu accusés. Dessous du corps de la couleur du dessus, parfois avec l'abdomen noirâtre. Pattes courtes avec les cuisses peu épaissies.

Longueur, 2 à 2 millim. 3. — Obock (Maindron), 1893.

Très voisin par sa coloration, et un peu de fascies, de *X. Raffrayi* Pic,

mais prothorax plus transversal, impressionné transversalement à la base, ponctuation plus forte, antennes entièrement claires, etc.

FORMICOMUS BISPILIFASCIATUS Pic var. **OBSCURIPENNIS** ♀.

Se distingue de la forme type par la coloration générale obscurcie, avec les élytres plus foncés, ceux-ci paraissant un peu plus courts. Une seule bande pileuse blanche très nette un peu après les épaules.

Obock (Maindron), 1893.

Formicomus Schimperi n. sp. ♂ ♀.

Modérément allongé avec les élytres assez larges, noir, passant au verdâtre sur les élytres. Tête pas très grosse, un peu diminuée et arrondie en arc en arrière, à ponctuation assez forte, écartée; yeux grisâtres, saillants. Antennes grêles, foncées, avec les premiers articles clairs, à peine épaissies à l'extrémité. Prothorax relativement étroit, convexe, dilaté-arrondi en avant, droit sur la base, à ponctuation assez forte, espacée. Écusson triangulaire. Élytres subovales (ayant les épaules marquées) à peine obliques en avant, tronqués ou subarrondis à l'extrémité, avec une pubescence grisâtre, espacée, fine; ponctuation peu forte, espacée. Pygidium saillant. Dessous du corps foncé. Pattes grêles, noires, ou parfois un peu roussâtres, à tibias postérieurs minces; ♂ ayant les cuisses antérieures munies d'une épine et les tibias dentés en dedans, à peu près sur leur milieu.

Longueur, 2 millim. 5 à 3 millim. 3. — Abyssinie (Schimper), 1850.

Voisin par sa taille et sa forme de *F. Alluaudi* Pic, mais prothorax noir.

FORMICOMUS ABYSSINICUS (? var. de SCHIMPERI).

Modérément robuste, peu allongé, noir, brillant, avec les élytres à reflets métalliques. Tête grosse, arrondie en arc en arrière, à ponctuation forte et espacée; yeux gris peu saillants. Antennes fortes, foncées, avec les premiers articles roussâtres. Prothorax convexe, assez long, à peu près de la largeur de la tête en avant, fortement dilaté en avant, étroit sur la base, à ponctuation peu rapprochée. Élytres subovales avec les épaules un peu effacées, obliques en avant, tronqués à l'extrémité, d'un noir brillant à reflets métalliques, ornés de poils grisâtres, longs et espacés, mais non condensés en bandes; ponctuation forte, écartée. Pattes un peu roussâtres, avec les cuisses plus foncées, robustes; fémurs larges, tibias postérieurs assez épais. Dessous du corps foncé.

Longueur, 3 millim. 3. — Abyssinie (Schimper), 1850.

F. abyssinicus rappelle de forme *F. Anceyi* Pic, avec une coloration différente et pas de fascie posthumérale grise; assez particulier, parmi les espèces à élytres métalliques, par sa forme, jointe à ses tibias postérieurs épais. Il est possible que *abyssinicus* soit une simple variété de l'espèce précédente.

Amblyderus latipennis n. sp.

Entièrement testacé mat, assez convexe, suboviforme, granuleux, paraissant glabre. Tête forte et large, granuleuse, échancrée et sillonnée sur son milieu en arrière; yeux noirs. Antennes courtes, bien épaissies au sommet, dernier article large et court. Prothorax granuleux, muni en avant de petites aspérités, tout à fait élargi en avant et plus large que la tête, muni antérieurement d'une ligne de dents émoussées brunâtres, les quatre médianes plus saillantes et larges, bien diminué postérieurement, un peu déprimé et sillonné longitudinalement en arrière sur le disque, tronqué sur la base, qui est rebordée. Écusson petit, arrondi au sommet. Élytres de forme ovoïde, relativement courts, bombés en dessus, bien arrondis sur les côtés et embrassant en dessus la majeure partie de l'abdomen, tout à fait larges près des épaules (celles-ci étant arrondies), bien atténués et arrondis à l'extrémité, finement granuleux et courtement pubescents. Dessous du corps à peu près de la couleur du dessus, orné de quelques poils clairs dressés. Pattes pas très fortes, avec les cuisses légèrement épaissies, les postérieures un peu arquées en dedans.

Longueur, 2 millimètres environ. — Abyssinie (Raffray), 1882.

Espèce remarquable par sa forme trapue, ses élytres larges après les épaules, puis fortement atténués à l'extrémité.

Amblyderus sulcithorax n. sp.

Presque mat, entièrement testacé, un peu plus pâle que le précédent, convexe et suboviforme, granuleux, paraissant glabre. Tête forte, pas très large, tronquée en arrière et sillonnée longitudinalement sur le vertex; yeux noirs. Antennes assez longues, relativement grêles, un peu élargies sur leurs derniers articles, le terminal un peu plus long que le précédent, en pointe émoussée au sommet. Prothorax à peine plus large que la tête, peu dilaté et bien arrondi en avant, muni antérieurement d'une ligne de dents émoussées, brunâtres, les six médianes plus fortes, bien diminué obliquement en arrière, non nettement déprimé mais sillonné longitudinalement; base tronquée et rebordée. Écusson non marqué. Élytres de forme ovoïde, peu courts, bombés en dessus, embrassant en dessous la majeure partie de l'abdomen, pas très larges aux épaules (celles-ci étant arrondies) et à peine atténués à l'extrémité, paraissant glabres. Dessous du corps de la couleur du dessus. Pattes pas très fortes avec les cuisses légèrement épaissies, les postérieures un peu arquées en dedans.

Longueur, 2 millimètres. — Djibouti (Jousseume).

D'après la description, paraît voisin de *A. aspericollis* Frm. de Madagascar, mais ce dernier n'est pas décrit avec le prothorax sillonné et n'offre que quatre dents seulement au-devant du prothorax; de plus, il paraît nettement pubescent. Il est un peu plus pâle que l'espèce précédente, avec une forme élytrale plus allongée, le prothorax moins dilaté en avant, etc.

Leptaleus senegalensis n. sp.

Assez large et robuste, entièrement d'un testacé jaunâtre avec un peu plus des deux tiers postérieurs des élytres d'un noir de poix; une impression posthumérale transversale garnie d'une fascie blanchâtre. Tête grosse, arrondie en arc en arrière, à ponctuation forte, peu écartée; yeux gris. Antennes peu longues, un peu épaissies et rembrunies au sommet. Prothorax très brillant, long, tout à fait dilaté-arrondi en avant, bilobé, sinué sur les côtés avec la base élargie paraissant bituberculée au-dessus, à ponctuation peu marquée. Écusson petit. Élytres finement ponctués et brièvement pubescents, courts et larges, droits aux épaules, celles-ci marquées mais arrondies, avec des fossettes peu marquées, une impression transversale posthumérale garnie de pubescence blanchâtre, portion en avant de cette bande de la coloration générale du corps, c'est-à-dire testacé roussâtre, tout le reste des élytres en arrière d'un noir de poix. Dessous du corps testacé. Pattes claires, minces et longues.

Longueur, 2 millim. 3. — Sénégal. — Podor (Maindron), 1881.

A placer près de *L. inflatipes* Pic, mais tout autre par la coloration et par les tibias ordinaires.

Anthicus inhumeralis n. sp.

Tout à fait étroit et allongé, très particulier, presque mat, brun fauve, couvert d'une fine pubescence grise assez rapprochée, avec la base des antennes, la majeure partie des pattes, la base du prothorax et une tache posthumérale d'un jaune pâle sur chaque élytre. Tête énorme par rapport au corps, carrée, tronquée en arrière, à ponctuation granuleuse dense; yeux gris; un peu saillants. Palpes jaunes, cultriformes, très longs; antennes pas très longues, assez grêles, d'un jaune pâle rembruni à l'extrémité, premiers articles allongés et à peu près égaux, le premier étant plus long, les derniers peu élargis subcarrés, le terminal un peu plus long que le précédent, en pointe émoussée au sommet. Prothorax brun fauve, finement et densément granulé, plus long que large, bien dilaté et un peu anguleux en avant du milieu, obliquement rétréci à la base, celle-ci rebordée et d'un jaune pâle. Écusson long, droit sur les côtés, triangulaire au sommet. Élytres tout à fait étroits et allongés avec les épaules obliques en avant et une sorte de saillie humérale peu marquée, pas plus larges que la tête, subparallèles, séparément arrondis à l'extrémité, à ponctuation fine; une tache jaune externe, n'atteignant pas la suture, après les épaules. Dessous du corps de la coloration du dessus. Pattes courtes, pâles, avec les cuisses un peu rembrunies et élargies.

Longueur, 2 millim. 3. — Zanguebar (F. Alexandre), 1890.

Cette espèce est remarquable et tout à fait particulière par sa forme étroite et allongée, la tête énorme par rapport au corps. Sans doute, on pourrait créer en son honneur une coupe sous-générique nouvelle, mais

j'attends pour cela des matériaux d'étude plus complets, nécessaires pour que je puisse me prononcer catégoriquement. Provisoirement, on pourra placer cette espèce dans le voisinage du groupe *Liparoderus* Laf.

***Anthicus Schimperi* n. sp.**

Oblong, un peu déprimé, noir, brillant, parfois vaguement brun, à pubescence grisâtre, assez épaisse et peu dense; membres roussâtres foncés ou obscurcis. Tête plus ou moins longue et diminuée en arrière, arrondie en arc sur cette partie, à ponctuation nette et écartée. Antennes assez longues, peu robustes, foncées, avec les premiers articles un peu roussâtres, article terminal très long en pointe émoussée au sommet. Prothorax plus long que large, dilaté-arrondi en avant, sinué sur les côtés, un peu élargi sur la base, rebordé et marqué d'une fossette latérale à pilosité blanche; ponctuation forte, peu écartée. Écusson petit. Élytres oblongs, un peu diminués en avant avec les épaules droites, mais arrondis, un peu élargis après le milieu, séparément arrondis à l'extrémité et marqués sur cette partie d'une petite dent; pubescence grisâtre assez épaisse, peu dense, mais bien visible et ponctuation assez forte, peu écartée. Dessous du corps foncé. Pygidium saillant. Pattes grêles et variables, un peu roussâtres ou noires.

Longueur, 2-3 millimètres. — Abyssinie (Schimper), 1850.

Rappelle *olivaceus* Laf., mais forme plus élargie et aspect non métallique, etc.; pattes plus foncées que chez les autres espèces de ce groupe avec une fossette latérale prothoracique bien marquée. Étudiée d'après la monographie de Laferté, cette espèce pourra prendre place près des *Anthicus piceus* Laf. ou *dichrous* Laf.

***Anthicus (Aulacoderus) Bouvieri* n. sp.**

Oblong, un peu déprimé, brillant, testacé, pâle avec la tête un peu rougeâtre, yeux noirs; pubescence claire en partie dressée sur le corps. Tête arrondie en arc en arrière, à ponctuation peu marquée, écartée. Antennes peu longues, grêles, un peu épaissies à l'extrémité avec l'article terminal bien plus long que le précédent. Prothorax à ponctuation forte et espacée, relativement long et étroit, un peu dilaté-arrondi en avant, rétréci en arrière avec un sillon, assez éloigné de la base, profond, arqué et pileux, surtout sur les côtés; en avant de ce sillon, sur les côtés, une sorte de dent latérale assez nette. Écusson petit, un peu transversal. Élytres bien plus larges que le prothorax à la base, un peu élargis après le milieu, légèrement atténués et subarrondis à l'extrémité, marqués d'une tache rembrunie suturale un peu avant l'extrémité; ponctuation assez forte, écartée. Dessous du corps de la coloration du dessus, ainsi que les pattes, celles-ci grêles.

Longueur, 2 millim. 5. — Environs d'Obock : lac Assal (Maindron), 1893.

On séparera facilement cette espèce des autres espèces pâles du groupe par la présence de la tache rembrunie suturale postmédiane et surtout par la structure particulière du prothorax, qui présente un sillon large et profond avec une sorte de dent latérale en avant de celui-ci.

J'ai le plaisir de dédier cet Insecte au sympathique directeur du laboratoire d'entomologie du Muséum.

OBSERVATION. Les *Formicomus Schimperi* et *Anthicus Schimperi*, décrits dans ce mémoire, figurent aussi dans la collection M. Pic.

HÉMIPTÈRES HÉTÉROPTÈRES NOUVEAUX
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR A.-L. MONTANDON.

GENRE *Pelagozus*.

P. nasutus NOV. sp.

Noirâtre avec les marges latérales du pronotum flaves, des petites taches pâles sur le bord externe et l'extrémité de l'élytre ainsi que sur la membrane, ces dernières parfois très rembrunies, peu visibles; pattes et rostre jaunâtres.

Tête noire, un peu brillante, très inégale à la surface, finement ruguleuse, très prolongée au-devant des yeux où elle s'avance d'une longueur égale au diamètre longitudinal de l'œil, en forme de visière ogivale un peu spatuliforme, surplombant très notablement la base du rostre, qui n'est visible qu'en regardant l'insecte en dessous ou de côté; cette partie antéoculaire de la tête obtusément carénée sur la ligne médiane longitudinale. La partie interoculaire avec deux tubercules obliques divergents en avant, où ils sont élargis et arrondis avec une petite tache jaune à leur partie antérieure juste au niveau de l'angle antérieur de l'œil. Entre ces deux tubercules, la ligne médiane longitudinale de la tête est déprimée comme par un large sillon mat, rétréci en arrière, s'arrêtant entre les ocelles. Partie postérieure de la tête un peu voûtée derrière les ocelles, entre les pédoncules des yeux. Yeux très convergents en avant, assez fortement sinués sur le milieu de leur côté interne.

Pronotum un peu plus large en avant que la tête avec les yeux; l'angle antérieur arrondi, un peu en dehors du niveau externe de l'œil; les côtés latéraux droits, très divergents en arrière, assez largement jaunâtres sur toute leur longueur; la bande jaunâtre lisse, atténuée en arrière devant l'angle latéral, qui est arrondi au sommet noirâtre comme tout le reste de la surface du pronotum finement granuleuse; le milieu de la tache jaunâtre